

# Ficha Técnica

# TRIFLURAT®

**1-Nome Comercial:** TRIFLURAT®

**2-Composição:**

Flocoumafen..... 0,005% (p/p)

**3-Fórmula Molecular:**



**4-Formulação:**

Bloco parafinado, bloco extrusado (extrusado a frio) e Isca fresca (massa) de coloração azulada.

**5-Apresentação:**

TRIFLURAT BLOCO PARAFINADO - Embalagem de 1Kg (blocos de 20g)

TRIFLURAT EXTRUSADO - Embalagem de 1Kg (blocos de 20g)

TRIFLURAT ISCAFRESCA - Embalagem de 1Kg (sachês de 10g)

**6-Toxicologia:**

DL50 oral aguda.....0,25 mg i.a/Kg;

**Classe toxicológica:** Flocoumafen - Classe III

**7-Mecanismo de ação:**

TRIFLURAT - Anticoagulante, age como antagonista da vitamina K1 necessária à produção dos fatores de coagulação II, VII, IX e X, sintetizados principalmente no fígado. O animal, após ingerir uma única dose, do produto, apresenta hemorragia interna e externa progressiva, até a morte.

**8-Indicações de uso:**

TRIFLURAT - É um rodenticida anticoagulante de dose única para uso em campanhas de saúde pública e uso por entidades especializadas. Eficaz para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

**9 - Modo de usar:**

TRIFLURAT - Colocar o produto Isca/Bloco, onde os roedores vivem e transitam como tocas, túneis, trilhas etc.

Dependendo do grau de infestação e tamanho da área colocar 1 a 2 iscas em cada ponto de iscagem. Nas trilhas os pontos devem distar cerca de 5 a 10 metros um do outro. Os pontos de



- ALTA ATRATIVIDADE E PALATABILIDADE
- INCOMPARÁVEL EFICÁCIA
- RESULTADOS RÁPIDOS

iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para avaliação do consumo e remanejamento das iscas onde não foram consumidas.

**Obs.:** Camundongos alimentam-se esporadicamente e costumam explorar novos objetos, por isso, pode ser vantajoso mudar, de vez em quando, as iscas de lugar. Ratazanas costumam desconfiar de objetos novos, o que pode dificultar a rápida ingestão da isca, apesar de sua alta palatabilidade.

RATICIDAS DE 2ª GERAÇÃO (DOSE ÚNICA)	DL 50 AGUDA ORAL PARA RATOS (mg/Kg)
Bromadiolone	1,12
Difetialone	0,51
Flocoumafen	0,27 - 0,56
Brodifacoum	0,27

### 10- PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não comer ou fumar durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Evitar contato com a pele e os olhos.
- Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.
- Não jogue no fogo ou incinerador.
- Pode ser fatal se ingerido.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

### 11- Sinais e sintomas de intoxicação:

Náuseas e vômitos podem ocorrer logo após a ingestão. A principal manifestação é o sangramento em diversos órgãos: sangramento gengival, sangramento nasal, tosse com sangue, fezes ou urina com sangue, hematomas e esquimosos. Casos de intoxicação severa: hemorragia maciça, dor abdominal.



CERTIFICADA  
NBR ISO 9001:2008

# Mais que produto. Suporte e garantia.

### 12-Armazenagem:

Armazenar o produto em local adequado e longe da fonte de calor.

### 13-Vazamento Acidental:

Absorver o produto com material inerte, tal como: papel toalha, terra, areia, caulim, pano e com ajuda de pá.

### 14-Eliminação e Descarte:

As embalagens vazias e sobras de produtos devem ser descartadas conforme a legislação Municipal ou Estadual.

Para maiores informações, acesse o site da ABAS: [www.as.org.br/embalagem.htm](http://www.as.org.br/embalagem.htm)

### 15-Primeiros Socorros:

- **INGESTÃO:** No caso de ingestão não provoque vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **OLHOS:** No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **PELE:** No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **INALAÇÃO:** No caso de inalação do produto procure local arejado e vá ao médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

### 16-Instruções para uso médico:

**Grupo Químico:** Cumarínico  
**Nome Comum:** Flocoumafen  
**Antídoto/Tratamento:** Vitamina K1 / Tratamento Sintomático  
**Telefone de Emergência 24 hs:** 0800 014 11 49

**Registro no M.S 3.0425.0143.002- 6** (Bloco)

**Registro no M.S 3.0425.0148.001- 5** (Extrusado)

**Registro no M.S 3.0425.0151.001- 1** (Isca Fresca)

### Fabricado por:

**Rogama Indústria e Comércio LTDA**

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, Nº 964

CEP: 12412-800 - Distrito Industrial, Pindamonhangaba – SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Indústria Brasileira

Site: [www.rogama.com.br](http://www.rogama.com.br)

e-mail: [sac@rogama.com.br](mailto:sac@rogama.com.br)

SAC: (12) 3644-3030

