



Baixo odor
Baixo custo
Ação residual

Código Comercial

1 L

101.103

Composição

Alfa-Cipermetrina 20% (p/p)

Formulação

Suspensão Concentrada (SC)

Indicações de uso

Inseticida na forma líquida suspensão concentrada é indicado no combate de baratas, mosquitos da malária, mosquitos (*Lutzomya longipalpis*) e barbeiros.

Mecanismo de ação

inseticida piretróide, age nas células nervosas dos insetos, ocasionando paralisia e morte.

Apresentação

Caixa com 12 frascos autodosador de 1 L

ALFATEK® 200 SC

A Alfa-Cipermetrina com o melhor custo x benefício do mercado!

Modo de usar

Deve ser aplicado através de pulverização, na dosagem especificada na tabela abaixo, diretamente sobre os insetos ou em seus locais de abrigo e passagem, como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis, etc. O tratamento deve ser repetido a cada semestre ou com outra frequência, é necessário manter vigilância entomológica para determinar o melhor calendário de aplicação ou suspensão do tratamento.

Pragas Alvo	Dosagens	Calda
Baratas	20 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Barbeiros	50 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Mosquitos (<i>Anopheles</i> spp.)	50 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Mosquitos (<i>Lutzomya longipalpis</i>)	50 mL/20 L de água	20 L/500 m ²

Somente utilizar a concentração indicada no quadro acima. Formulação Suspensão Concentrada é suscetível a separação de fase. Agite antes de usar. Pulverizar com bico 80.02

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. O profissional responsável pela aplicação do produto deverá submeter-se aos exames admissional, periódico e demissional.

Fórmula molecular



Alfa-Cipermetrina

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

Classificação toxicológica

Alfa-Cipermetrina - Classe II

Nº de Registro no MS:

3.0425.0135.001-4

Nº do CAS: Alfa-Cipermetrina:

67375-30-8

Fabricado por: Baston

Av. das Palmeiras, 1705 - Colônia Francesa

Palmeira/PR - CNPJ: 05.885.974/0001-70

Aut. Func. no MS nº. 3.04067-3

Indústria Brasileira

Período de reentrada

Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada pode ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas; exceto idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Fraqueza, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreias, dor abdominal, redução de visão, salivação abundante, lacrimejamento, palidez e sudorese.

Armazenagem

Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.

Vazamento acidental

Em caso de derramamento, absorver o produto com material inerte, tais como terra, areia e pano, recolhendo-os para área de descarte de lixo químico.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de tríplice lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

Indicações Para Uso Médico

Princípio ativo: Alfa-Cipermetrina

Grupo químico: Piretroide

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico/Tratamento sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:
0800 014 11 49



Comercializado e distribuído por: Neogen

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - CEP: 12412-800
Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP - CNPJ: 90.821.554/0001-42
Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4
Indústria Brasileira
Site: www.rogama.com.br
E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030