



FORMIGAMA

Nome comercial: OZZ FORMIGAMA

Composição: Indoxacarb.....0,05% (p/p)
Benzoato de Denatônio.....0,001% (p/p)
Atrativos e veículo.

Formulação: Gel

Indicação de uso: Inseticida gel, atrativo e palatável, com ação residual e de baixa toxicidade, para uso doméstico, indicado no controle de formigas doceiras.

Mecanismo de ação: Indoxacarb - Inseticida do grupo químico Oxadiazina, bloqueador dos canais de sódio; mantém os canais de sódio fechados, bloqueando o fluxo normal dos íons de sódio para o interior da célula nervosa, impedindo a transmissão do impulso nervoso, causando paralisia e morte do inseto.

Apresentação: Seringa de 10g

Fórmula molecular:



Toxicologia:

DL50 oral para ratos.....> 2000 mg/Kg
DL50 dermal para ratos.....> 2000 mg/Kg

Classificação toxicológica: Indoxacarb - Classe I

Modo de usar:

Destampar a seringa e pressionar o êmbolo, aplicando pequenos pontos de gel nos locais próximos onde as formigas transitam e se abrigam como frestas, rachaduras e cantos de paredes, não aplicar o produto sobre as trilhas dos insetos.

Dosagem: 0,05 g/m². Não utilizar dosagem acima do recomendado.

Precauções:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. As embalagens vazias devem ser descartadas no lixo doméstico comum, que deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não é necessário desocupar a área. Formulação contém substância amargante que previne a ingestão acidental por humanos.



Código Comercial
10 g 101.085

● Atrativo e palatável ● Ação residual de 2 à 4 meses

● Prático no manuseio e econômico

Sinais e sintomas de intoxicação:

Pode causar irritação de pele, olhos e trato respiratório.

Vazamento acidental:

Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para o lixo doméstico.

Descarte de embalagens:

As embalagens deverão ser descartadas em lixos domésticos.

Primeiros socorros:

OLHOS: No caso de contato com os olhos, lave-os com água fria corrente em abundância e procure o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto; INGESTÃO: No caso de ingestão não provoque o vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto; PELE: No caso de contato com a pele, lave-a com água fria corrente e sabão em abundância, e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto; Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Oxadiazina

Princípio ativo: Indoxacarb

Ação Tóxica: Hipersensibilidade e anemia

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico e Tratamento Sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h: 0800 014 11 49

REGISTRO M.S.: 3.0425.0109.001-2

Nº do CAS: Indoxacarb: 173584-44-6

Benzoato de Denatônio: 3734-33-6

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba/SP - CNPJ: 90.821.554/0001-42 - **Indústria Brasileira**

Site: www.homeozz.com.br - E-mail: sac@neogendobrasil.com.br

SAC: (12) 3644.3030

NEOGEN do Brasil

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba/SP

Sites: Neogen.com.br | Rogama.com.br - Tel: (12) 3644.3030

Curta nossa página no Facebook

/ROGAMA Linha Profissional

/NEOGEN do Brasil