



RI-DO-RATO GRÃOS

Nome comercial: OZZ RI-DO-RATO GRÃOS

Composição: Brodifacoum 0,005% (p/p)

Formulação: Grãos na coloração verde

Indicação de uso: Raticida em grãos, indicado para áreas internas ou externas, com alto nível de infestação e alta competição alimentícia, no controle de ratazanas (*Rattus norvegicus*), ratos de telhado (*Rattus rattus*) e camundongos (*Mus musculus*). Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias, comércios, hospitais e escolas.

Mecanismo de ação: Raticida anticoagulante de segunda geração de dose única; interrompe o ciclo de formação da vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue; causando hemorragias e consequentemente a morte dos roedores. Ela ocorrerá de 3 a 7 dias após a ingestão da dose suficiente do raticida.

Apresentação: Embalagem de 200 g (sachê de 20 g), caixa com 8 Kg.

Fórmula molecular:



Brodifacoum

Toxicologia:

DL50 oral aguda para ratos..... >2.000 mg/kg

DL50 dermal aguda para ratos..... >2.000 mg/kg

Classificação toxicológica: Brodifacoum - Classe III

Modo de usar:

Aplicar o raticida onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas e túneis; Recomendação: 1 a 2 sachês por ponto de iscagem, porém é necessário avaliar o grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, para determinar a quantidade de iscas em cada ponto de iscagem; Recomenda-se que os pontos de iscagem tenham uma distância de 5 a 10 metros entre eles e estejam devidamente identificados e mapeados; Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas; Quando possível, recomenda-se dispor as iscas em caixas porta iscas, para proteção do raticida e dificultar o acesso para espécies não alvo do controle; É importante manter as caixas porta iscas fixadas, fechadas, identificadas e mapeadas; Os pontos de aplicação devem ser distantes ou fora do alcance de crianças e animais domésticos; Não aplicar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos ou outros materiais.

Informações adicionais:

Ratazanas e ratos de telhado costumam desconfiar de novos objetos dispostos no ambiente, o que pode dificultar a rápida ingestão da isca raticida, apesar de sua alta atratividade e alta palatabilidade. Camundongos costumam explorar novos objetos e alimentam-se esporadicamente, desta forma pode ser vantajoso remanejar as iscas raticida no ambiente.

Precauções:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO!

PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer ou fumar durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Não jogue no fogo ou incinerador. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Formulação contém substância amargante que previne a ingestão accidental por humanos.

Período de reentrada:

Não é necessário desocupar a área para realizar a aplicação.



Código Comercial
200 g | 100.080

- Não contém parafina ● Dose única e alta potência
- Alta atratividade e alta palatabilidade ● Não gera resíduos no ambiente
- Indicado para áreas com alta competição alimentícia

Sinais e sintomas de intoxicação:

A ingestão do produto poderá provocar náuseas, vômitos e, após alguns dias, equimoses, sangramento excessivo após traumatismo, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina. Nos casos mais graves, observam-se hemorragias macias que podem levar a morte.

Armazenagem:

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e em local adequadamente destinado a esta finalidade. Não transportar e armazenar com alimentos e/ou medicamentos.

Vazamento acidental:

Isolar a área, usar luvas impermeáveis e recolher o produto para áreas de descarte de lixo químico.

Eliminação e descarte:

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros:

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provocar o vômito.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Cumarínico

Princípio ativo: Brodifacoum

Ação Tóxica: Hipersensibilidade e anemia

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 (Fitomenadiona). Controlar hemorragias. Lavagem gástrica precoce. Administração de carvão ativado.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h: 0800 014 11 49

REGISTRO M.S.: 3.0425.0099.001-1

Nº do CAS: Brodifacoum: 56073-10-0



FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba/SP - CNPJ: 90.821.554/0001-42 - Indústria Brasileira

Site: www.homeozz.com.br - E-mail: sac@neogen.com

SAC: (12) 3644.3030

NEOGEN do Brasil

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba/SP

Sites: neogen.com | homeozz.com.br - Tel: (12) 3644.3030

Curta nossa página no Facebook

/ROGAMA Linha Profissional /NEOGEN do Brasil