



RI-DO-RATO GS

Nome comercial: OZZ RI-DO-RATO GS

Composição: Brodifacoum.....0,005% (p/p)
Benzoato de denatônio.....0,0001% (p/p)
Atrativos, aglutinante, solvente e corante.

Formulação: Sementes de girassol de coloração verde

Indicação de uso: Indicado para uso doméstico em áreas internas ou externas. Efetivo no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Mecanismo de ação: Brodifacoum - Raticida anticoagulante de segunda geração de dose única; interrompe o ciclo de formação da vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue; causando hemorragias e consequentemente a morte dos roedores. Ela ocorrerá de 3 a 7 dias após a ingestão da dose suficiente do raticida.

Apresentação: Embalagem de 200 g (10 sachês de 20 g).

Fórmula molecular:

C₃₁H₂₃BrO₃

Toxicologia:

DL50 oral para ratos (ativo).....0,27 mg/Kg
DL50 dermal para ratos (ativo).....0,27 mg/Kg

Classe Toxicológica: Brodifacoum - Classe III

Modo de usar:

Aplicar o raticida onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas e túneis. Recomendação: 1 a 2 sachês por ponto de iscagem, porém é necessário avaliar o grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, para determinar a quantidade de iscas em cada ponto de iscagem. Recomenda-se que os pontos de iscagem tenham uma distância de 5 a 10 metros entre eles. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo, reposição das iscas e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas. Quando possível, recomenda-se dispor as iscas em caixas porta-iscas, para proteção do raticida e dificultar o acesso para espécies não alvo do controle. Os pontos de aplicação devem ser distantes ou fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não aplicar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos ou outros materiais.

Informações adicionais:

Ratazanas e ratos de telhado costumam desconfiar de novos objetos dispostos no ambiente, o que pode dificultar a rápida ingestão da isca raticida, apesar de sua alta atratividade e alta palatabilidade. Camundongos costumam explorar novos objetos e alimentam-se esporadicamente, desta forma pode ser vantajoso remanejar as iscas raticida no ambiente.

Precauções:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

Durante o manuseio usar luvas e evitar o contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber, nem fumar durante a aplicação. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos, não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação. Conservar o local desratizado em perfeita condições de limpeza. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não transportar nem armazenar com alimentos, nem medicamentos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios da cozinha, plantas e aquários. Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original. Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo. Não reutilizar embalagem vazia. Não deve contaminar os cursos de água. Produto contém substância amargante que previne a ingestão acidental por humanos.



Código Comercial

200 g | 100.076

● Dose única

● Altamente atrativo e eficaz

Sinais e sintomas de intoxicação:

A ingestão do produto poderá provocar náuseas, vômitos e, após alguns dias, equimoses, sangramento excessivo após traumatismo, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina. Nos casos mais graves, observam-se hemorragias maciças que podem levar a morte.

Vazamento acidental:

Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para o lixo doméstico.

Descarte de embalagens:

Após a aplicação do raticida, descartar as embalagens no lixo doméstico.

Primeiros socorros:

INGESTÃO: No caso de ingestão não provoque o vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto; **OLHOS:** No caso de contato com os olhos, lave-os com água fria corrente em abundância e procure o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto; **PELE:** No caso de contato com a pele, lave-a com água fria corrente e sabão em abundância, e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto; **INALAÇÃO:** No caso de inalação do produto, procure um local arejado e vá ao médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Cumarínicos

Princípio ativo: Brodifacoum

Ação Tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias (efeito cumulativo)

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e Tratamento Sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h: 0800 014 11 49

REGISTRO M.S.: 3.0425.0162.001-1

Nº do CAS: Brodifacoum : 56073-10-0



FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba/SP - CNPJ: 90.821.554/0001-42 - **Indústria Brasileira**

Site: www.homeozz.com.br - E-mail: sac@neogendobrasil.com.br

SAC: (12) 3644.3030

NEOGEN do Brasil

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba/SP

Sites: Neogen.com.br | Rogama.com.br - Tel: (12) 3644.3030

Curta nossa página no Facebook

[f/ROGAMA Linha Profissional](https://www.facebook.com/ROGAMA.LinhaProfissional)

[f/NEOGEN do Brasil](https://www.facebook.com/NEOGEN do Brasil)