



# RI-DO-RATO PLUS

**Nome comercial:** OZZ RI-DO-RATO PLUS

**Composição:** Brodifacoum.....0,005% (p/p)  
Benzoato de Denatônio .....0,0001% (p/p)

**Formulação:** Isca Granulada (Pellets) de coloração rosa.

**Indicação de uso:** Indicado para uso doméstico em áreas internas. Efetivo no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

**Mecanismo de ação:** Brodifacoum - Raticida anticoagulante de segunda geração de dose única; interrompe o ciclo de formação da vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue; causando hemorragias e consequentemente a morte dos roedores. Ela ocorrerá de 3 a 7 dias após a ingestão da dose suficiente do raticida.

**Apresentação:** Embalagem de 1 Kg (sachês de 20g)

**Fórmula molecular:**



**Toxicologia:**

DL50 oral para ratos.....0,27 mg/Kg  
DL50 dermal para ratos.....0,27 mg/Kg

**Modo de usar:**

Aplicar o raticida onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas e túneis. Recomendação: 1 a 2 sachês por ponto de iscagem, porém é necessário avaliar o grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, para determinar a quantidade de iscas em cada ponto de iscagem. Recomenda-se que os pontos de iscagem tenham uma distância de 5 a 10 metros entre eles. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo, reposição das iscas e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas. Quando possível, recomenda-se dispor as iscas em caixas porta-iscas, para proteção do raticida e dificultar o acesso para espécies não alvo do controle. Os pontos de aplicação devem ser distantes ou fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não aplicar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos ou outros materiais.

**Informações adicionais:**

Ratazanas e ratos de telhado costumam desconfiar de novos objetos dispostos no ambiente, o que pode dificultar a rápida ingestão da isca raticida, apesar de sua alta atratividade e alta palatabilidade. Camundongos costumam explorar novos objetos e alimentam-se esporadicamente, desta forma pode ser vantajoso remanejar as iscas raticida no ambiente.

**Precauções:**

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**  
**CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**

Durante o manuseio usar luvas e evitar o contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber, nem fumar durante a aplicação. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos, não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condições de limpeza. Não transportar nem armazenar com alimentos, nem medicamentos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original. Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo. Não reutilizar embalagem vazia. Não deve contaminar os cursos de água. Produto contém substância amargante que previne a ingestão accidental por humanos.



**Código Comercial**  
1 Kg | 100.058

• Altamente atrativo e palatável

• Dose única

**Sinais e sintomas de intoxicação:**

A ingestão do produto poderá provocar náuseas, vômitos e, após alguns dias, equimoses, sangramento excessivo após traumatismo, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina. Nos casos mais graves, observam-se hemorragias maciças que podem levar a morte.

**Vazamento acidental:**

Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para o lixo doméstico.

**Descarte de embalagens:**

Após a aplicação do raticida, descartar as embalagens no lixo doméstico.

**Primeiros socorros:**

**INGESTÃO:** No caso de ingestão não provoque o vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto; **OLHOS:** No caso de contato com os olhos, lave-os com água fria corrente em abundância e procure o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto; **PELE:** No caso de contato com a pele, lave-a com água fria corrente e sabão em abundância, e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto; **INALAÇÃO:** No caso de inalação do produto, procure um local arejado e vá ao médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado.

## INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

**Grupo Químico:** Cumarínicos

**Princípio ativo:** Brodifacoum

**Ação Tóxica:** Fragilidade capilar e hemorragias (efeito cumulativo)

**Antídoto/Tratamento:** Vitamina K1 e Tratamento Sintomático

**TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h: 0800 014 11 49**

**REGISTRO M.S.: 3.0425.0137.001-5**

**Nº do CAS: Brodifacoum :** 56073-10-0

**FABRICADO POR: NEOGEN**

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba / SP - CNPJ: 90.821.554/0001-42 - Indústria Brasileira

Site: [www.homeozz.com.br](http://www.homeozz.com.br) - E-mail: [sac@neogendobrasil.com.br](mailto:sac@neogendobrasil.com.br)

SAC: (12) 3644.3030

**NEOGEN do Brasil**

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba/SP

Sites: [Neogen.com.br](http://Neogen.com.br) | [Rogama.com.br](http://Rogama.com.br) - Tel: (12) 3644.3030

**Curta nossa página no Facebook**

[f /ROGAMA Linha Profissional](#) [f /NEOGEN do Brasil](#)