



Dose múltipla
Hidrorrepelente
Frasco aplicador

Código Comercial

1 Kg

100.005

Composição

Warfarin 1% (p/p)

Formulação

Pó de contato

Indicações de uso

Raticida pó de contato hidrorrepelente, para uso profissional e em campanhas de saúde pública, no controle de ratas (*Rattus norvegicus*), ratos de telhado (*Rattus Rattus*) e camundongos (*Mus musculus*). Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias e comércios.

Mecanismo de ação

Raticida anticoagulante de primeira geração de dose múltipla; interrompe o ciclo de formação da vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue; causando hemorragias e consequentemente a morte dos roedores. Ela ocorrerá de 3 a 7 dias após a ingestão da dose suficiente do raticida.

Apresentação

Frasco talqueira de 1 Kg, caixa com 12 Kg.



RI-DO-RATO® PÓ DE CONTATO

Fórmulação hidrorrepelente e de fácil aplicação

Modo de usar

Aplicar o raticida onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas e túneis, através de polvilhadeira ou do próprio frasco aplicador do pó de contato; Polvilhar em faixas de 5 à 15 cm de largura e 35 à 45 cm de comprimento; Quando possível, recomenda-se dispor o raticida em caixas porta iscas, para proteção do produto e dificultar o acesso para espécies não alvo do controle; Os pontos de aplicação devem ser inspecionados após 2 ou 3 dias, para verificar a necessidade de nova aplicação ou remanejamento das caixas porta iscas; É importante manter as caixas porta iscas fixadas, fechadas, identificadas e mapeadas; Os pontos de aplicação devem ser distantes ou fora do alcance de crianças e animais domésticos; Não aplicar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos ou outros materiais.

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Durante o manuseio, usar luvas, máscaras, proteção ocular e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original. Formulação contém substância amargante que previne a ingestão acidental por humanos.



Fórmula molecular



Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... 0,27 mg i.a/Kg

DL50 oral aguda para cachorros..... 0,27 mg i.a/Kg

DL50 oral aguda para gatos..... 0,27 mg i.a/Kg

Classificação toxicológica

Warfarin - Classe II

Período de reentrada

Não é necessário desocupar a área para realizar a aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Náuseas e vômitos podem ocorrer logo após a ingestão. A principal manifestação é o sangramento em diversos órgãos: sangramento gengival, sangramento nasal, tosse com sangue, fezes ou urina com sangue, hematomas e esquimoses. Casos de intoxicação severa: hemorragia maciça, dor abdominal.

Armazenagem

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e em local adequadamente destinado a esta finalidade. Não transportar e armazenar com alimentos e/ou medicamentos.

Vazamento acidental

Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para área de descarte de lixo químico.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964

CEP: 12412-800

Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Indústria Brasileira - Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Warfarin

Grupo químico: Cumarínico

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 / Tratamento Sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0120.001-2

Nº do CAS: Warfarin: 81-81-2

