



Efeito desalojante
Indicado para manejo de resistência
Controle em todas as fases de vida dos insetos

Código Comercial

1 L	101.135
250 mL	101.139

Composição

Alfa-Cipermetrina.....5% (p/p)
Piriproxifem.....5% (p/p)

Formulação

Concentrado Emulsionável (CE)

Indicações de uso

Inseticida líquido (concentrado emulsionável), com ação desalojante e residual, atuando sobre todas as fases de vida dos insetos, para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de baratas, carrapatos, moscas, mosquitos, percevejos de cama e pulgas. Pode ser aplicado em residências, indústrias e comércios.

Mecanismo de ação

Inseticida com dois ativos **Alfa-Cipermetrina** e **Piriproxifem**.

Alfa-Cipermetrina: Inseticida do grupo químico Piretroide, modulador dos canais de sódio; prolonga ou impede o fechamento normal dos canais após a transmissão do impulso nervoso, o que ocasiona na constante entrada de sódio na célula nervosa, resultando em impulsos nervosos repetitivos, exaustão e morte do inseto. **Piriproxifem:** IGR (regulador de crescimento dos insetos); atua de forma análoga ao hormônio de crescimento (juvenóide), impedindo que as formas jovens (larvas, ninfas e pupas) cheguem à fase adulta. Ademais, possui ação ovicida e reduz a fertilidade dos insetos adultos.

Apresentação

Caixa com 12 frascos coex de 1 L e caixa com 24 frascos coex de 250 mL

INSETICIDA IG® MAX

Eficaz em todas as fases de vida dos insetos

Modo de usar

Agite bem antes de usar. Diluir o produto em água, homogeneizar e aplicar através de pulverização, utilizando ponta de pulverização 80.02 na dosagem especificada na tabela abaixo, diretamente sobre os animais alvo do controle ou em seus locais de abrigo e passagem, como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis.

Pragas alvo	Dosagem	Calda
Baratas, mosquitos, moscas e pulgas	50 mL/ 10 L de água	10 L/200 m ²
Percevejos de cama e carrapatos	100 mL/ 10 L de água	10 L/200 m ²

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Usar equipamento de proteção individual (EPI) como roupa protetora, luvas, protetor ocular e respiratório. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias.

Fórmula molecular

$C_{22}H_{19}ClNO_3$
Alfa-Cipermetrina

$C_{20}H_{19}NO_3$
Piriproxifem

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

Classificação toxicológica

Alfa-Cipermetrina - Classe II

Piriproxifem - Classe IV

Nº de Registro no MS:

3.0425.0166

Nº do CAS: Alfa-Cipermetrina:

67375-30-8

Nº do CAS: Piriproxifem:

95737-68-1

Período de reentrada

Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. Libere a área para o uso após um período de 6 horas de ventilação; exceto idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica), dispneia (crise asmática), prurido nasal (rinite alérgica). Intoxicação por ingestão em altas doses: vômito, diarreia, convulsão e parada respiratória.

Armazenagem

Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.

Vazamento acidental

Absorver o produto com material inerte, tais como terra, areia, caulim e pano, recolhendo-os para área de descarte do lixo químico.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de tríplice lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

Indicações Para Uso Médico

Princípio ativo: Alfa-Cipermetrina / Piriproxifem

Grupo químico: Piretróides / Éter piridiloxipropílico

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico conhecido.
Tratamento sintomático.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49



Fabricado por: Neogen

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - CEP: 12412-800

Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42 - Indústria Brasileira

Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030