



Dose única  
Atrativo e palatável  
Resistente à umidade e calor

### Código Comercial

500 g (blocos de 20 g)

100.029

### Composição

Brodifacoum 0,005% (p/p)

### Formulação

Bloco parafinado de coloração verde

### Indicações de uso

Raticida anti-coagulante de dose única eficaz no combate aos ratos, ratazanas e camundongos.

### Mecanismo de ação

Age como antagonista da Vitamina K1, necessária ao metabolismo dos fatores de coagulação II, VII, IX e X, que são sintetizados principalmente no fígado, prejudicando a coagulação sanguínea. O animal após ingerir uma única dose do produto, apresenta hemorragia interna e externa progressivamente até a morte.

### Apresentação

Bandeja de 500 g (blocos de 20 g), caixa com 12 Kg.

## RIGON® BLOCO PARAFINADO

Raticida resistente e ideal para controle de roedores em áreas externas

### Modo de usar

As iscas devem ser colocadas onde os roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis, etc. Dependendo do grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, colocar 1 a 2 iscas em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, os pontos devem distar cerca de 5 a 10 m um do outro. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Recomenda-se colocar as iscas em caixas porta-iscas, inacessíveis a espécie não alvo. Não colocar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas forem consumidas.

### Informações adicionais


Ratazanas e ratos de telhado costumam desconfiar de novos objetos dispostos no ambiente, o que pode dificultar a rápida ingestão da isca raticida, apesar de sua alta atratividade e alta palatabilidade. Camundongos costumam explorar novos objetos e alimentam-se esporadicamente, desta forma pode ser vantajoso remanejar as iscas raticida no ambiente.

### Precauções

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.** Durante o manuseio usar luvas, máscaras, proteção ocular e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida ao ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original.

Curta nossa página no Facebook: NEOGEN do Brasil

### Fórmula molecular



Brodifacoum

### Toxicologia

\*DL50 oral aguda para ratos..... 0,27 mg i.a/Kg

### Classificação toxicológica

Brodifacoum - Classe III

### Nº de Registro no MS:

3.0425.0110.001-8

### Nº do CAS: Brodifacoum:

56073-10-0

### Período de reentrada

Não é necessário desocupar a área para realizar a aplicação.

### Sinais e sintomas de intoxicação

Se houver ingestão do produto poderá apresentar náuseas, vômitos e, após alguns dias, equimoses, sangramentos excessivos após traumatismos, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina, hemorragias maciças nos casos mais graves que podem levar à morte.

### Armazenagem

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e em local prévio e adequadamente destinado a esta finalidade. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

### Vazamento acidental

Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para área de descarte de lixo químico.

### Eliminação e descarte

Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura. As embalagens vazias devem ser descartadas ou incineradas. Observar a legislação Estadual e Municipal específicas.

### Primeiros socorros

Em caso de ingestão não provoque vômito. Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviços de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

### Indicações Para Uso Médico

**Princípio ativo:** Brodifacoum

**Grupo químico:** Cumarínico

**Antídoto/Tratamento:** Vitamina K1 e Tratamento sintomático

**TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:**  
**0800 014 11 49**



\*Referência: Brodifacoum, HAZ-MAPA, 2023

### Fabricado, comercializado e distribuído por: Neogen

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - CEP: 12412-800  
Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP - CNPJ: 90.821.554/0001-42  
Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4  
Indústria Brasileira  
Site: [www.rogama.com.br](http://www.rogama.com.br)  
E-mail: [sac@neogen.com](mailto:sac@neogen.com) - SAC: (12) 3644.3030