



Dose única
Alta atratividade
Alta palatabilidade
Menor deposição de resíduos no ambiente

Código Comercial

1 Kg

100.053

Composição

Brodifacoum.....0,005% (p/p)

Formulação

Massa oleosa de coloração verde

Indicações de uso

Rodenticida anticoagulante de dose única para uso em campanhas de saúde pública, uso por entidades especializadas, efetivo no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Mecanismo de ação

Age como antagonista da vitamina K1 necessária ao metabolismo dos fatores de coagulação II, VII, IX e X que são sintetizados principalmente no fígado prejudicando a coagulação sanguínea. O animal após ingerir uma única dose do produto apresenta hemorragia interna e externa progressiva até a morte.

Apresentação

Embalagem de 1 Kg (iscas de 10 g), caixa com 12 Kg.

RIGON® IFR

Isca altamente atrativa: maior consumo e menor deposição de resíduos no ambiente

Modo de usar

As iscas devem ser colocadas onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas, túneis, etc. Dependendo do grau de infestação e tamanho da área a ser tratada colocar 2 a 4 iscas em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, os pontos devem distar cerca de 5 a 10 metros um do outro. Recomenda-se colocar as iscas em caixas porta - iscas inacessíveis a espécie não alvo. Não colocar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas. Os pontos de aplicação devem ser distantes ou fora do alcance de crianças e animais domésticos. Os porta-iscas devem ser fixados, fechados, identificados e mapeados.

Informações adicionais

Ratazanas e ratos de telhado costumam desconfiar de novos objetos dispostos no ambiente, o que pode dificultar a rápida ingestão da isca raticida, apesar de sua alta atratividade e alta palatabilidade. Camundongos costumam explorar novos objetos e alimentam-se esporadicamente, desta forma pode ser vantajoso remanejar as iscas raticida no ambiente.

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Não reutilizar as embalagens vazias. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura. A limpeza de eventuais resíduos deve ser realizada com uso de luvas, colocando-os em saco plástico devidamente fechado e encaminhado para destinação final adequada. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Formulação contém substância amargante que previne a ingestão acidental por humanos.

Fórmula molecular

$C_{31}H_{23}BrO_3$
Brodifacoum

Toxicologia

*DL50 oral aguda para ratos..... 0,27 mg i.a/Kg

Classificação toxicológica

Brodifacoum - Classe III

Nº de Registro no MS:

3.0425.0153.001-2

Nº do CAS: Brodifacoum:

56073-10-0

*Referência: Brodifacoum, HAZ-MAPA, 2023

Período de reentrada

Não é necessário desocupar a área para realizar a aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Se houver ingestão do produto poderá ocorrer náuseas, vômitos e, após alguns dias, equimoses, sangramentos excessivos após traumatismos, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina, hemorragias maciças que podem levar à morte.

Armazenagem

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e em local adequadamente destinado a esta finalidade. Não transportar e armazenar com alimentos e/ou medicamentos.

Vazamento acidental

Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para áreas de descarte de lixo químico.

Eliminação e descarte

Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada, recolha o material com auxílio de uma pá, coloque em recipiente lacrado e identificado e contate a empresa registrante. As embalagens vazias, devem ser descartadas, incineradas ou enterradas em fosso para lixo tóxico. Observar a legislação estadual e municipal vigente. Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.

Primeiros socorros

APRESENTE O RÓTULO QUANDO ESTIVER RECEBENDO ASSISTÊNCIA MÉDICA.

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local arejado. Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos lavar com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito.

Indicações Para Uso Médico

Princípio ativo: Brodifacoum

Grupo químico: Cumarínico

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e Tratamento sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49



Fabricado por: Neogen

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - CEP: 12412-800

Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42 - Indústria Brasileira

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

ZAPI S.P.A

Via Terza Strada, 12-35026

Conselve (Padova) - Italy

Tel.: +39 049 9597785

Fax.: +39 049 9597789