



RI-DO-RATO FARELADO

Nome comercial: OZZ RI-DO-RATO FARELADO

Composição: Cumatetralil.....0,037% (p/p)
Benzoato de Denatônio0,0001% (p/p)
Atrativos e corante.


Formulação: Granulado

Indicação de uso: Indicado para uso doméstico em áreas internas. Efetivo no controle de ratos e camundongos.

Mecanismo de ação: Cumatetralil - Raticida anticoagulante de primeira geração de dose múltipla; interrompe o ciclo de formação da vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue; causando hemorragias e consequentemente a morte dos roedores. Ela ocorrerá de 3 a 7 dias após a ingestão da dose suficiente do raticida.

Apresentação: Embalagens de 100g e 200g (com trava de segurança)

Fórmula molecular:



Toxicologia:

DL50 oral para ratos (ativo).....> 16,5 mg/Kg
DL50 oral para coelhos> 40 mg/Kg
Classe Toxicológica: Cumatetralil: Classe I

Modo de usar:

Dispor o raticida em um recipiente raso e aplicar onde os roedores vivem e transitam como tocas, embaixo ou atrás de móveis, entre outros.

Os pontos de iscaçgem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo, reposição das iscas e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas.

Quando possível, recomenda-se dispor as iscas em caixas porta-iscas, para proteção do raticida e dificultar o acesso para espécies não alvo do controle.

Os pontos de aplicação devem ser distantes ou fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não aplicar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos ou outros materiais.

Informações adicionais:

Ratazanas e ratos de telhado costumam desconfiar de novos objetos dispostos no ambiente, o que pode dificultar a rápida ingestão da isca raticida, apesar de sua alta atratividade e alta palatabilidade. Camundongos costumam explorar novos objetos e alimentam-se esporadicamente, desta forma pode ser vantajoso remanejar as iscas raticida no ambiente.

Precauções:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

Durante o manuseio usar luvas e evitar o contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber, nem fumar durante a aplicação. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar local desratizado em perfeita condições de limpeza. produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original. Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo. Não reutilizar embalagem vazia. Não se deve contaminar os cursos de água. Produto contém substância amargante que previne a ingestão acidental por humanos.



Código Comercial

100 g	100.039
200 g	100.040

• Alta atratividade

• Seguro

• Alta palatabilidade

Sinais e sintomas de intoxicação:

A ingestão do produto poderá provocar náuseas, vômitos e, após alguns dias, equimoses, sangramento excessivo após traumatismo, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina. Nos casos mais graves, observam-se hemorragias maciças que podem levar a morte.

Vazamento acidental:

Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para o lixo doméstico

Descarte de embalagens:

Após a aplicação do raticida, descartar as embalagens no lixo doméstico.

Primeiros socorros:

INGESTÃO: No caso de ingestão não provoque o vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto; **OHOS:** No caso de contato com os olhos, lave-os com água fria corrente em abundância e procure o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto; **PELE:** No caso de contato com a pele, lave-a com água fria corrente e sabão em abundância, e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto; **INALAÇÃO:** No caso de inalação do produto, procure um local arejado e vá ao médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Cumarínico

Princípio ativo: Cumatetralil

Ação Tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias (efeito cumulativo)

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e Tratamento Sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h: 0800 014 11 49

REGISTRO M.S.: 3.0425.0119.001-7

Nº do CAS: Cumatetralil: 5836-29-3



FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964 - CEP: 12412-800 - Distrito Industrial

Pindamonhangaba / SP - CNPJ: 90.821.554/0001-42 - **Indústria Brasileira**

Site: www.homeozz.com.br - E-mail: sac@neogendobrasil.com.br

SAC: (12) 3644.3030

NEOGEN do Brasil

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba/SP
Sites: Neogen.com/pt/ | Rogama.com.br - Tel: (12) 3644.3030

Curta nossa página no Facebook

/ROGAMA Linha Profissional

/NEOGEN do Brasil